



2500 16th Street . San Francisco, CA 94103 . (415) 554-3030

INFORMACION IMPORTANTE

Cuidado en el hogar

Mantenga a su gato confinado a la casa por los próximos siete (7) días, los perros sólo deben salir a caminar de correa por los próximos siete (7) días. Durante las primeras 24 horas después de la cirugía, es especialmente importante mantenerlos calentitos y quietos.

Si su mascota se muestra interesado/a en comer, ofrézcale una pequeña cantidad de comida y agua después de las 7:00 p.m. Si su mascota todavía está soñoliento/a, o si vomita, espere hasta la mañana siguiente para ofrecerle comida. Si su mascota no vomita, puede repetir otra pequeña cantidad de comida más o menos una hora después. Si su mascota no come ni bebe para la tarde siguiente, por favor llámenos.

Mascotas menores de cuatro meses de edad deben comer tan pronto como lleguen a la casa. Si su mascota no come su comida regular, trate de darle comida en lata o comida de bebé.

Su mascota no puede ser bañada ni puede nadar por diez (10) días después de la cirugía.

No permita ningún tipo de agitación o ejercicio a su mascota por parte de ninguna persona por los próximos siete días.

Sea especialmente cuidadoso de advertir a niños que no toquen el estómago de su mascota.

Desaliente a su perro a morder, rascar o lamer el sitio de la incisión; esto puede causar mucha inflamación o pueda exudar la herida.

Para gatos machos use papel de periódico en lugar de arena por las primeras 24 horas después de la cirugía.

Preste atención a lo siguiente

Efecto Anestético:

Los dueños de gatos notarán que sus mascotas parecen embriagadas, también estarán un poco calladas, pero deberían volver a la normalidad al día siguiente.

Los dueños de perros notarán que sus mascotas tiemblan o salivan. Esto es normal y desaparecerá al día siguiente. Su perro puede olvidar su entrenamiento y podría orinar en la casa, así que manténgalo confinado al baño o la cocina hasta que el efecto anestético desaparezca.

Sangrado y Moretones

Podría haber una pequeña cantidad de sangre saliendo de la incisión. Si esto persiste, por favor llámenos. Moretones bajo o alrededor del sitio de la operación es normal, esto debería resolverse por sí solo, pero si parece excesivo llámenos.

Lamidas

NO deje que su perro se lama el sitio de la incisión. Todas las mascotas, a excepción de los gatos machos, irán a casa con un e-collar. Su mascota debe usarlo hasta que la incisión se cure.

Suturas

No hay necesidad de volver al SF/SPCA para remover las suturas; las suturas que nosotros usamos se disuelven solas. En algunas hembras (perros y gatos) se presenta hinchazón del tamaño de un nogal alrededor o bajo del sitio de la incisión en la primera semana. Esto es normalmente una reacción a las suturas de la capas inferiores del tejido. Esto **NO** es un problema y puede tomar hasta un mes para resolver, pero si la hinchazón aumenta u otra anomalía se presenta, por favor llámenos.

La clínica tiene personal veterinario a disposición seis (6) días a la semana. Llame al **554-3030** entre las 8:30 am y las 5:00 pm. Si decide buscar cuidado veterinario en otro lugar durante este periodo, *la responsabilidad financiera será solamente suya*. Porque somos una organización sin fines de lucro, no podemos hacernos responsables por el cuidado médico recibido en otro hospital veterinario.

Examine cada día para asegurarse de que el área de la incisión no esté inflamada y que el estómago no esté hinchado. Cualquier problema directamente relacionado con la incisión de la cirugía será tratado y cubierto por la clínica del SF/SPCA. Si usted observa problemas después de siete (7) días, por favor contáctenos para una evaluación de su caso.