



手術後重要須知

回家後

您的寵物剛剛進行了麻醉，並接受了嗎啡類藥物來控制疼痛。您的寵物可能看起來會昏昏欲睡。可能會顫抖或搖晃。可能會有一些嗚咽。貓有時瞳孔會放大，看起來會像“玻璃般的眼睛”。

請讓您的寵物在一個安全，溫暖黑暗，遠離樓梯，小孩，和其他寵物的地方慢慢恢復。

提供少量的食物，但如果您的寵物不感興趣，不要驚慌。他或者她可能正因為麻醉而感到惡心。

您的寵物應該會在第二天早晨恢復成原來的自己。

對於公貓，手術後 24 小時內請使用報紙代替貓砂（粗沙塵會導致寵物的傷口感到不適）。

七天內的注意事項

在接下來的七天裡，狗應該被拴著走路。禁止奔跑，跳躍，粗野動作。不能玩扔球，不能游泳，不能洗澡。

如果您的母貓習慣出去玩，請試著把她留在屋子裡一個星期，並監視觀察她的切口。

早晚各看一次切口。如果發現任何發紅，腫脹或分泌物，請與我們聯繫。

您的寵物會帶著 e-collar 回家。這是為了防止在切口部位舔，咬或咀嚼。請讓您的寵物帶著 e-collar 7 天，尤其是在您的寵物無人看管的情況下（比如晚上睡覺或者獨自在家時）。

請不要讓家中其他寵物咀嚼或舔到傷口。

由於我們使用的縫合線是自溶解的，所以不需要再返回醫院診所進行拆除縫合線。

任何與手術直接相關的問題將由舊金山 SPCA 根據以下指南進行處理：

- 如果上午 8 點到下午 6 點之間發生的任何併發症，每週七天，請致電 415-554-3030。您可能會被指示返回舊金山 SPCA 的 Spay/Neuter 診所或去醫院進行後續護理。
- 對於非營業時間（週一到週日，下午 6 點到早上 8 點），請致電 415-554-3030 與我們的 Pacific Heights 分部聯絡，我們的獸醫技師會為您提供意見。

- 對未能遵守出院指示的併發症，我們將不會負責：例如移除 e-collar 或使用“甜甜圈”式的 e-collar。

如果您選擇在任何其他機構尋求獸醫服務，所有的經濟責任將完全由您承擔—我們不會負責您在其他獸醫機構產生的費用。